

Resumen de los datos epidemiológicos VIH y Sida 2018

Datos Mundiales:

A pesar de los grandes avances logrados en estos últimos 30 años en el conocimiento de la infección y en su tratamiento, la infección por VIH y el Sida siguen siendo un problema de salud pública mundial de primer orden.

Según el último informe emitido por **ONUSIDA** a finales del año 2017 en el mundo:

- **36,9 millones [31,1 millones–43,9 millones] de personas vivían con el VIH, poco más de un 10% más que en 2010.**
- **1,8 millones [1,4 millones–2,4 millones] de personas contrajeron la infectaron por VIH (unas 4.930 personas al día).**
- **1 millón de personas fallecieron por causas relacionadas con el VIH y el Sida (unas 2.740 personas al día).**
- **21,7 millones [19,1 millones–22,6 millones] de personas tenían acceso a terapia antirretrovírica (casi un 52,8% del total de personas que vivían con el VIH).**
- **940.000 [670.000–1,3 millones] personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida.**

Desde 1981 que comenzó esta **pandemia se han infectado más de 77 millones de personas en todo el mundo, en concreto 77,3 millones [59,9 millones–100 millones], de los cuales han fallecido 35,4 millones [25,0 millones–49,9 millones] de personas por causas relacionadas con el Sida.**

Personas que viven con el VIH con acceso a la terapia antirretrovírica

- En 2017, 21,7 millones [19,1 millones–22,6 millones] de personas que vivían con el VIH tenían acceso a la terapia antirretrovírica, un aumento de 2,3 millones desde 2016 y con relación a los 8 millones [7,1 millones–8,3 millones] de 2010.
- En 2017, el 59% [44–73%] de las personas que vivían con el VIH tuvieron acceso al tratamiento.
 - El 59% [44–73%] de adultos mayores de 15 años que vivían con el VIH tuvieron acceso al tratamiento, así como el 52% [37–70%] de niños hasta 14 años.
 - El 65% [49-80%] de las mujeres adultas mayores de 15 años y el 53% [38-66%] de los hombres adultos mayores de 15 años tuvieron acceso a tratamiento.
- En 2017, el 80% [61– >95%] de las mujeres embarazadas que vivían con el VIH tuvieron acceso a medicamentos antirretrovíricos para evitar la transmisión del VIH a sus hijos.

Nuevas infecciones por el VIH

- Desde el pico alcanzado en 1996, las nuevas infecciones por el VIH se han reducido en un 47%.
 - En 2017, se produjeron 1,8 millones [1,4 millones–2,4 millones] de nuevas infecciones por el VIH, en comparación con los 3,4 millones [2,6 millones– 4,4 millones] de 1996.
- Desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH en adultos descendieron alrededor de un 16%, desde 1,9 millones [1,5 millones–2,5 millones] hasta 1,6 millones [1,3 millones–2,1 millones] en 2017.
 - Desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH en niños descendieron un 35%, desde 270.000 [170.000–400.000] en 2010 hasta 180.000 [110.000–260.000] en 2017.

Muertes relacionadas con el SIDA

- Desde el pico alcanzado en 2004, los casos de muertes relacionadas con el sida se han reducido en más de un 51%.
 - En 2017, fallecieron 940.000 [670.000–1,3 millones] personas en todo el mundo a causa de enfermedades relacionadas con el sida, frente a los 1,9 millones [1,4 millones–2,7 millones] de 2004 y los 1,4 millones [1 millón–2 millones] de 2010.

90-90-90

- En 2017, tres de cada cuatro personas que vivían con el VIH (75%) conocían su estado.
- Entre las personas que conocían su estado serológico, cuatro de cada cinco (79%) tenían acceso al tratamiento.
- Y, entre las personas que tenían acceso al tratamiento, cuatro de cada cinco (81%) habían logrado la supresión viral.
- El 47% de toda la gente que vive con el VIH tiene una carga viral indetectable.

Mujeres

- Cada semana, alrededor de 7.000 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contraen la infección por el VIH.
 - En África Subsahariana, tres de cada cuatro infecciones nuevas afectan a las adolescentes de entre 15 y 19 años. Las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años tienen el doble de probabilidades de vivir con el VIH que los hombres.
- Más de un tercio (35%) de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida.
 - En algunas regiones, las mujeres que son víctimas de la violencia tienen un 50% más de probabilidades de contraer la infección por el VIH.

Grupos de población clave

- Los grupos de población clave y sus parejas sexuales representan:
 - El 47% de las infecciones nuevas por el VIH a nivel mundial.
 - El 95% de las infecciones nuevas por el VIH en Europa Oriental y Asia Central, y el Oriente Medio y África Septentrional.
 - El 16% de las infecciones nuevas por el VIH en África Oriental y Meridional.
- El riesgo de contraer el VIH es:
 - 27 veces mayor entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres,
 - 23 veces mayor entre las personas que se inyectan drogas,
 - 13 veces mayor para las trabajadoras sexuales,
 - 13 veces mayor para las mujeres transgénero.

El VIH y la tuberculosis

- La tuberculosis continúa siendo la principal causa de muerte entre las personas que viven con el VIH, siendo responsable de aproximadamente una de cada tres muertes relacionadas con el sida.
- En 2016, 10,4 millones de personas desarrollaron tuberculosis, de las cuales 1,2 millones vivían con el VIH.
 - Las personas que viven con el VIH y no presentan síntomas de tuberculosis necesitan la terapia preventiva contra la tuberculosis, que disminuye el riesgo de desarrollar dicha enfermedad y reduce las tasas de mortalidad de la tuberculosis y el VIH en un 40% aproximadamente.
- Se estima que el 49% de las personas que viven con el VIH y la tuberculosis desconocen su coinfección y, por lo tanto, no reciben atención.